AZD9291

PROTOCOLLO	**Studio in aperto, multicentrico, di fase I per valutare efficacia e tollerabilità, farmacocinetica e attività antitumorale preliminare di una dose crescente di AZD9291 in pazienti affetti da NSCLC, in progressione dopo un trattamento con un inibitore tirosinchinasico di EGFR**
obiettivo dello studio (breve descrizione per gli utenti)	**Obiettivo primario**: - Valutare la sicurezza e la tollerabilità di AZD929, preso oralmente, in pazienti affetti da NSCLC, in progressione dopo un trattamento con un inibitore tirosinchinasico di EGFR **Obiettivi secondari:** - Definire la dose massima tollerata (MTD), o la massima dose possibile. - Ottenere una valutazione preliminare dell'attività antitumorale di AZD9291 attraverso la valutazione del risposta al tumore, usando Metodo RECIST
nome del farmaco (o dei farmaci in combinazione)	**AZD9291** (Nome del principio attivo)
nome commerciale del farmaco	
tipo di studio	studio sponsorizzato di fase I
neoplasia in esame (descrizione)	**NSCLC**
tipologia del paziente eleggibile per il protocollo (i criteri di eleggibilità)	Pazienti affetti pazienti affetti da NSCLC in progressione
controindicazioni (i criteri di esclusione)	- Pazienti trattati con un inibitore tirosinchinasico di EGFR (erlotinib or gefitinib) negli 8 giorni precedenti l'inizio del trattamento - Intervento chirurgico (ad esclusione di introduzione di accesso vascolare) nelle 4 settimane che precedono la prima dose del trattamento